



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 19 au 25 novembre 2012
(Semaine 47)

A RETENIR

Syndrome grippal

- Activité faible (réseau sentinelles et urgences CHPf), aucun prélèvement réalisé.

Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 8 prélèvements analysés.

Diarrhées

- Activité faible (réseau sentinelles et urgences CHPf).

Fièvre

- Activité faible (réseau sentinelles et urgences CHPf).

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis janvier 2012, 64 cas de salmonellose ont été déclarés, dont 17 à *Salmonella enteritidis*.
- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés sont en cours d'application (Arrêtés n° 1649 et n° 1651 du 15 novembre 2012).
- En attendant, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

Dengue - Nouvelle-Calédonie

- Bilan au 30 novembre : depuis janvier 2012, 402 cas de dengue sont confirmés, on observe une augmentation du nombre de cas ces dernières semaines : 30 cas en octobre et 123 cas en novembre, dont 25 en semaine 46 et 35 en semaine 47.
- Tous les cas sérotypés sont de type I.
- Il est recommandé aux personnels de santé une vigilance accrue face à toute suspicion clinique de dengue.

Novel coronavirus


- Au 30 novembre, 9 cas d'infection à *Novel coronavirus* ont été confirmés: 5 cas en Arabie Saoudite (dont 3 décès), 2 cas au Qatar et 2 cas (2 décès) en Jordanie. Les cas de Jordanie datent d'avril 2012.
- En Arabie Saoudite, 3 cas sont épidémiologiquement liés mais on ne sait pas encore s'il y a eu transmission inter-humaine ou exposition à une source de contamination commune.
- Les connaissances actuelles sont limitées, la possibilité de transmission inter-humaine semble difficile. Les symptômes sont ceux d'une infection respiratoire aiguë ressemblant à une pneumonie.
- Pour plus d'informations, voir le BHI de l'InVS :
<http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international/Tous-les-numeros/2012/Bulletin-hebdomadaire-international-du-21-au-27-novembre-2012.-N-375>

Bulletin téléchargeable sur le site :


- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndrômes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour syndrômes grippaux, par semaine (données ILM)




Fièvre isolée




Nombre hebdomadaire moyen de fièvres isolées vues en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour fièvre isolée




Dengue



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$) de plus de 3 jours sans cause évidente
- Urétrite masculine : Dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Diarrhée : A02 à A09
- Urétrite et syndrome urétral : N34
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Fièvre isolée : R509

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

Bureau de veille sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Auguste Buluc

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201
Fax: 488 212
Astreinte : 706 502

Mail : veille@sante.gov.pf