



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 24 au 30 décembre 2012  
(Semaine 52)

### A RETENIR

#### Syndrome grippal

- Activité faible (réseau sentinelles et urgences CHPf). Aucun prélèvement n'a été réalisé.

#### Syndrome dengue

- Activité syndromique faible, aucun cas confirmé sur 16 prélèvements analysés.

#### Diarrhées

- Activité syndromique en hausse (réseau sentinelles) et toujours élevée aux urgences.

#### Fièvre

- Activité syndromique en diminution (réseau sentinelles et urgences CHPf).

### AUTRES ACTUALITES LOCALES

#### Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- En 2012, 77 cas de salmonellose ont été déclarés, dont 21 à *Salmonella enteritidis*.
- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés sont en cours d'application (Arrêtés n° 1649 et n° 1651 du 15 novembre 2012).
- En attendant, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

#### Leptospirose

- Suite aux importants épisodes pluvieux, le risque de leptospirose est accru. Il est important de rappeler les mesures de prévention, à savoir éviter le contact de la peau avec de l'eau ou de la boue pouvant être souillées par les urines d'animaux. Il est aussi important de consulter rapidement dès les premiers symptômes.
- **4 cas confirmés dont 1 décès en semaine 51 et 7 cas confirmés en semaine 52.**

### ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)

#### Dengue - Nouvelle-Calédonie

**- L'épidémie de dengue I en Nouvelle-Calédonie a été déclarée le 5 décembre 2012.**

- Bilan au 4 janvier : 307 cas en décembre. 63 cas en semaine 51, 83 cas en semaine 52 et 70 cas en semaine 1 (semaine en cours).
- Il est recommandé aux personnels de santé une vigilance accrue face à toute suspicion clinique de dengue.
- Pour des informations complémentaires, le site internet de la DASS - NC : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/Dengue](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue)

#### Grippe - France métropolitaine


- Incidence estimée en semaine 52 : 293 cas pour 100 000 habitants : deuxième semaine au dessus du seuil épidémique, démarrage de l'épidémie de grippe.
- Les régions les plus touchées sont : Champagne-Ardenne (591/100 000 hab.), Alsace (396), Languedoc-Roussillon (373), Midi-Pyrénées (356), Rhône-Alpes (307), Ile-de-France (290), Picardie (290).

Bulletin téléchargeable sur le site :


- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

## Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndrômes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour syndrômes grippaux, par semaine (données ILM)




## Fièvre isolée




Nombre hebdomadaire moyen de fièvres isolées vues en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour fièvre isolée




## Dengue



## Diarrhées



## Indicateurs d'activité



### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ( $> 38^{\circ}\text{C}$ ) de plus de 3 jours sans cause évidente
- Urétrite masculine : Dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Diarrhée : A02 à A09
- Urétrite et syndrome urétral : N34
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Fièvre isolée : R509

### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

### Bureau de veille sanitaire :

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Auguste Buluc

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201  
Fax: 488 212  
Astreinte : 706 502

Mail : [veille@sante.gov.pf](mailto:veille@sante.gov.pf)