

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 17 février 2012 - Semaine 06-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 06 (07 au 13/02/2012)

Grippe

- Activité stable, aucun virus grippal isolé cette semaine sur 3 prélèvements analysés.

Dengue

- Activité faible.

Diarrhées

- Activité en augmentation depuis plusieurs semaines et en particulier en semaine 6 chez les enfants de moins de 4 ans (consultations aux urgences du CHPf). Le laboratoire de microbiologie du CHPf nous signale un début d'épidémie de gastro-entérites à **rotavirus**.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, 61 cas confirmés de gastro-entérites à *Salmonella* ont été enregistrés, dont 41 à *S. enteritidis*. 22 cas confirmés à *S. enteritidis* ont été hospitalisés.
- Les oeufs produits dans certains élevages de Pf sont à l'origine de cette épidémie. Une partie des productions incriminées ont été retirées du marché, mais des prélèvements sont toujours en cours dans d'autres élevages. **Le Ministère de la Santé recommande toujours de bien cuire les oeufs (blanc et jaune) pendant 5 minutes au minimum à 65°C et d'éviter toute préparation à base d'oeufs crus.**
- Afin de suivre au mieux l'efficacité de ces mesures sur les infections, nous demandons aux médecins de réaliser des coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite fébrile. Merci aux biologistes de nous signaler les cas confirmés à *Salmonella*.

Campagne Filariose

- La campagne de lutte contre la filariose a commencé dans les établissements scolaires (13/02 au 09/03). Autres dates à retenir : visite des ambassadeurs à domicile du 12/03 au 23/03, ISEPP le 29/02, dispensaires du 26/03 au 30/03, pharmacies d'officine du 27/03 au 01/04 et stands le 27/03.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

France métropolitaine

- Début de l'épidémie de grippe : les taux d'incidence sont plus élevés dans la région Sud-Est du pays, notamment dans la région PACA et Languedoc-Roussillon. D'après l'ensemble des prélèvements réalisés, la répartition des virus isolés est la suivante :

- # 97 % virus grippaux de type A : 69 % A(H3N2), 4 % A(H1N1)pdm09, 25 % A non typés ;
- # 3 % virus grippaux de type B.

Parmi les virus A(H3N2), une circulation en proportion significative de virus antigéniquement variants par rapport à la souche vaccinale A/Perth/16/2009 est observée. Il n'est pas possible à ce jour de conclure quant à l'impact de cette observation sur l'efficacité du vaccin grippal utilisé cette saison.

- Diarrhées: les données de surveillance montrent une activité stable, en-dessous du seuil épidémique signifiant vraisemblablement la fin de l'épidémie (Réseau Sentinelles) et inférieure à la saison hivernale précédente à la même période (données de surveillance des urgences hospitalières). Cette saison, l'épidémie de gastro-entérites a été de faible intensité. Les données virologiques montrent la circulation prédominante des norovirus de génotype GII4 comme les années précédentes.

Fidji

- Fidji rapporte que les inondations qui ont dévasté l'ouest de Viti Levu ont diminué et que la plupart des gens ont regagné leurs foyers. Les autorités sanitaires sont préoccupées par le risque d'éventuelles flambées de diarrhées, de leptospirose, de fièvre typhoïde et de dengue.

Dengue

- L'épidémie de DENV-2 à Yap, Etats Fédérés de Micronésie, a significativement diminué par rapport au pic atteint en novembre 2011. Environ 10 cas suspects par semaine sont encore enregistrés, le dernier cas confirmé a été notifié le 24 janvier, il n'y a pas eu d'hospitalisations depuis le 31 janvier.
- L'épidémie de DENV-4 aux Îles Marshall a diminué de manière significative sur Majuro, mais des cas continuent d'être rapportés sur Ebeye (atoll de Kwajalein) et d'autres atolls extérieurs.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :


Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé

Equipe du Bureau de veille sanitaire :


Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste ; Elise Daudens
Infirmier : Jean-Paul Pescheux - Secrétaire ; Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolé pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)




Dengue


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like





Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du nombre de cas confirmés





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:
Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM