

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 13 avril 2012 - Semaine 14-2012

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 14 (02 au 08/04/2012)

Grippe

- Activité faible, pas de virus isolé cette semaine.

Dengue

- Activité faible.
- Des sérotypes du virus de la dengue autres que ceux ayant récemment circulé en Polynésie ont été identifiés dans le Pacifique sud entraînant un **risque épidémique** lié à l'introduction d'un nouveau sérotype en Polynésie. Nous recommandons devant un tableau clinique compatible avec une dengue : PCR avant J5 (si PCR+, un typage sera réalisé) ou sérologie IgM après J5.

Diarrhées

- Epidémie de gastro-entérites aiguës en phase descendante.

Fièvre

- Augmentation de l'activité.

NB : le nombre de médecins sentinelles répondants est en baisse compte tenu des vacances scolaires

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Diminution du nombre de cas à *S. enteritidis* rapportés par les laboratoires, en lien avec les mesures mises en place dans les élevages. Le risque persiste et il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

Inondations (Fiji)

- Les inondations ont régressé en laissant d'importants dégâts dans la division Ouest.
- Une réponse multi-sectorielle d'envergure, coordonnée par le Bureau national de gestion des catastrophes, est en cours.
- Le groupe de travail national pour le contrôle des maladies à potentiel épidémique a apporté son aide dans l'orientation des activités post-inondation concernant les maladies transmissibles, en particulier pour les 3 principales menaces : la leptospirose, la fièvre typhoïde et la diarrhée.

Dengue

- La Nouvelle-Calédonie rapporte 21 cas de dengue confirmés depuis le premier janvier 2012 (2 la semaine dernière). La majorité des cas sont de sérotype 1, 2 cas importés sont de sérotype 2.
- Une épidémie de dengue continue à sévir à Kiribati, 243 cas cliniques ont été signalés la semaine dernière. Le sérotype circulant n'est pas encore connu.
- Niue: 27 cas de tests rapides positifs sont rapportés par Niue (+18 de la semaine dernière), ainsi que plus de 20 autres cas cliniques. Les tests de confirmation et le sérotypage sont en cours.

Leptospirose

- Nouvelle-Calédonie: 41 cas ont été signalés depuis le début de l'année 2012, dont 13 cas (dont 1 décès) au cours du mois d'avril.
- Fidji: Une épidémie de leptospirose a été déclarée pour la division de l'Ouest par le Ministère de la Santé.

France

- Fin de l'activité épidémique de grippe, en métropole, au niveau national. Persistance de la circulation du virus localement : des foyers ou des cas sporadiques de grippe sont encore attendus




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens
Infirmier : Jean-Paul Pescheux et Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - astreinte: 706 502 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM