

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 6 juillet 2012 - Semaine 26-2012

Téléchargeable sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm
ou sur le site du Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 26 (25/06 au 1/07/2012)

Grippe

- Activité en augmentation, avec augmentation des syndromes grippaux rapportés par le réseau sentinelle. Pas de nouveau cas de virus grippal confirmé au laboratoire

Dengue

- Activité faible. Aucun cas confirmé.

Diarrhées

- Activité en augmentation chez les plus de 4 ans sur le réseau sentinelle mais en diminution aux urgences.

Fièvre

- Activité stable, de niveau intermédiaire, dans le réseau et aux urgences (syndromes viraux probables)

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Gastro-entérite à *Salmonella typhi*

- Le cas de fièvre typhoïde (*Salmonella typhi*) en semaine 26 avait déjà été rapporté dans le précédent bulletin. Les investigations réalisées depuis n'ont pas mis en évidence de cas secondaire. Le cas index âgé de 26 ans avait été hospitalisé, actuellement guéri. Il habite le quartier Mamao de Papeete. L'origine de l'infection n'a pas été retrouvée (pas de voyage récent, pas de contact avec des voyageurs, aucune consommation à risque).

Gastro-entérites à *Salmonella enteritidis*

- Il est toujours recommandé de consommer les oeufs bien cuits : blanc et jaune, cuisson pendant 5 minutes au minimum à 65°C. Eviter toute préparation à base d'oeufs crus.

Paludisme d'importation

- Un cas de paludisme d'importation avait été signalé en semaine 26 au Bureau de veille sanitaire (P. Vivax).

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

Syndrome grippal dans le Pacifique

- Dans l'hémisphère sud, l'activité grippale est faible malgré des signes de hausse saisonnière.
- Du 17 au 23 juin, en Australie, 666 échantillons de SG ont été reçus et 102 (15,3%) se sont révélés positifs pour la grippe: 1 A/H1N1, 61 A/H3, 13 A (non sous-typés) et 27 B (lignée non déterminée).
- En Nouvelle-Zélande, du 18 au 24 Juin, l'activité grippale est inférieure au seuil épidémique.

Ciguatera à Futuna

- Futuna rapporte 6 cas de ciguatera (augmentation inhabituelle). Nous n'avons pas d'information supplémentaire sur l'origine de la source de contamination.

Epidémie de dengue en Nouvelle-Calédonie

- Nombre de cas depuis le 01/09/2011 : 203 depuis le 01 janvier 2012
- Le nombre de cas positifs diminue depuis plusieurs semaines.

Fièvre aux Salomon

- Dans les îles Salomon, le nombre de cas de fièvre est toujours en diminution. Cependant, 6 échantillons de l'hôpital de Kilu'ufi ont été déclarés positifs pour la rubéole.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmières de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet - Epidémiologiste : Elise Daudens
Infirmier : Jean-Paul Pescheux, Auguste Buluc - Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - astreinte: 706 502 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours
ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:
Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM