

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 6 aout 2010



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

Point épidémiologique hebdomadaire

Ce qu'il faut retenir en semaine 30-2010 :

Grippe

Activité faible.

Dengue

Activité en dessous du seuil épidémique.

Diarrhées

Activité stable.

Fièvre isolée

Activité faible.

Actualités en Polynésie française :

- Surveillance active des syndromes grippaux au vue de l'actualité régionale
- Il est toujours recommandé de réaliser des **prélèvements** de selles chez les jeunes enfants présentant des syndromes dysentériques.
- Cas groupés de **coqueluche** aux Marquises, investigation en cours.
- Fiches de signalements de cas de ciguatera, par île, téléchargeables sur : <http://www.ilm.pf/DeclarationCiguatera>

Actualités régionales :

- Circulation du virus AH1N1pdm dans le Pacifique. Début d'une deuxième vague épidémique de grippe AH1N1 pdm en Nouvelle Zélande. Augmentation des syndromes grippaux dans plusieurs pays de la région.
- Bulletin disponible sur http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Toute augmentation inhabituelle de syndromes ou maladies dans votre patientèle doit nous être rapidement signalée.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ;
Centre de la mère et de l'enfant ;
Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ;
Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé ;
Centre d'hygiène et de salubrité publique ;
Réseau des médecins sentinelles ;
Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ;
Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ;
Laboratoires privés ;
Cliniques privées Cardella et Paofaï ;
Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Dr HP Mallet, responsable de bureau / E Daudens, épidémiologiste / E Frogier et JP Pescheux, infirmiers

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée ($\geq 38.5^\circ$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée ($\geq 38.5^\circ$) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours, ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^\circ$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue : A90 - A91

Diarrhée : A02 à A09

Fièvre isolée : R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire :

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM