

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 06 décembre 2011 - Semaine 47-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 47 (21 au 27/11/2011)

Grippe

- Légère augmentation de l'activité grippale. Aucun cas n'a été confirmé en semaine 47 (mais un cas vient d'être confirmé positif en virus grippal A/H1N1 en semaine 48).

Denque

- Activité faible, pas de cas confirmés (4 analyses demandées).

Diarrhées

- Activité en augmentation sur le réseau sentinelle, surtout aux Iles-sous-le-vent (Huahine, Bora). - Au niveau des urgences du CHPf, l'activité a diminué depuis 2 semaines (pic en semaine 46).

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Epidémie de gastro-entérites à Salmonella

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, **22 cas confirmés de gastro-entérites à Salmonella** ont été enregistrés au Bureau de veille sanitaire, dont 10 à **Salmonella enteritidis** (12 en attente de typage). Parmi ces cas, **13 ont été hospitalisés**. Autour de ces cas, au moins 20 cas probables supplémentaires (non prélevés) ont été identifiés.

- Les investigations épidémiologiques et les prélèvements alimentaires ont permis d'identifier les oeufs comme source commune probable des contaminations.

- Un premier résultat de prélèvements réalisés dans un élevage de poules pondeuses de Tahiti est positif à **Salmonella enteritidis**. La société d'élevage **SANGUE FARM** a décidé d'arrêter la commercialisation de ses oeufs et a organisé leur retrait. Il s'agit des boîtes d'oeufs avec n° d'agrément **2010-PF**.

Les résultats des prélèvements programmés dans les autres élevages suspects seront connus dans les prochains jours.

- Nous recommandons à la population de ne pas consommer les oeufs SANGUE FARM 2010-PF. Dans ce contexte épidémique, il est également fortement conseillé de **ne pas consommer d'oeufs crus ou peu cuits** ou des préparations en contenant. Un communiqué de presse diffusé le 05/12 rappelle l'ensemble des mesures d'hygiène préconisées (voir PJ).

- Nous demandons à tous les médecins et biologistes de bien vouloir signaler directement au BVS les cas suspects et confirmés de salmonellose.

Denque

- La vigilance est de mise compte tenu de la situation actuelle dans le Pacifique. Pensez à proposer un prélèvement aux malades présentant un tableau clinique de dengue, et en particulier s'il s'agit de voyageurs en provenance de zones affectées par la dengue.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Denque dans le Pacifique

- A ce jour, 1012 cas suspects ont été reportés à Majuro (**Iles Marshall**). Sur les 918 cas testés par test rapide, 480 sont positifs. Seul le sérotype DEN-2 circule. A Yap, 560 cas cliniques ont été enregistrés, dont 127 personnes hospitalisées.

Typhoïde à Fidji

- Un grand nombre de villageois de la division occidentale ont été affectés par la typhoïde. Le nombre de cas rapportés dépasse les 100 avec quelques hospitalisations. Le ministère de la santé continue ses interventions de mobilisation. Nous attendons une confirmation du nombre des cas et de l'origine de cette flambée.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Vaea Rougeolles
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM