

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 13 mai 2011 - Semaine 18-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Bureau de veille sanitaire

A retenir en semaine 18 (02 au 08/05/2011)

Grippe

- Diminution de l'activité grippale sur Tahiti Nui.
- **Activité toujours élevée à Nuku Hiva.**
- Un seul prélèvement a été analysé (négatif).

Denque

- Aucune circulation virale active.

Diarrhées

- Diminution de l'activité de consultation pour diarrhées.

Fièvre

- Activité faible.

Autres activités locales

Chikungunya

L'état d'alerte et de veille sanitaire a été activé à la Direction de la santé.

Nous rappelons aux professionnels de santé que toute demande de confirmation biologique de cas suspect de chikungunya doit être adressée au Bureau de veille sanitaire (via la fiche de surveillance ou par téléphone au 488201 / 706502).

Filariose

La campagne de distribution à domicile se poursuit jusqu'au 22 mai.

Un enseignement post-universitaire ouvert à tous les professionnels de santé aura lieu le 19 mai à 19h30 à l'hôpital du Taaone (programme en PJ).

Actualités internationales

Chikungunya

La Nouvelle-Calédonie recense au 13 mai un nombre total de 22 cas (21 cas confirmés et 1 probable), localisés à Nouméa, Dumbéa et Sarramea. Détails sur :

http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya

L'alerte épidémique n'est pas encore déclenchée en NC. La situation est donc suivie avec la plus grande attention.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:




Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine

Equipe du Bureau de veille sanitaire :




Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Agnès Rodrigues-Da-Costa, Secrétaire : Thilda Tehaamoana

Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée ($\geq 38^{\circ}5$) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM