

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 20 mai 2011 - Semaine 19-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Bureau de veille sanitaire

A retenir en semaine 19 (09 au 15/05/2011)

Grippe

- Activité grippale faible .
- Persistance de cas de syndromes grippaux dans les Iles Sous-Le-Vent et aux Marquises (Atuona).
- Aucun prélèvement cette semaine.

Dengue

- Activité syndromique faible.
- Aucune dengue confirmée (8 prélèvements).

Diarrhées

- Activité de consultation faible.

Fièvre

- Pas de variation significative au niveau de l'activité de consultation .

Autres activités locales

Chikungunya

- L'état d'alerte et de veille sanitaire est toujours activé à la Direction de la santé.
- Nous rappelons aux professionnels de santé que toute demande de confirmation biologique de cas suspect de chikungunya doit être adressée au Bureau de veille sanitaire (via la fiche de surveillance ou par téléphone au 488201 / 706502).

Filariose

- La campagne de distribution à domicile se poursuit jusqu'au 22 mai.
- Elle se poursuivra dans les pharmacies, dispensaires et certains cabinets médicaux du 23 au 29 mai.
- Les stands dans les lieux publics seront mis en place du jeudi 26 au dimanche 29 mai.

Rougeole

- Compte tenu de l'épidémie en France, une importation de cas est à redouter sur notre territoire.
- Une note d'information sur la maladie et la conduite à tenir devant un cas suspect de rougeole a été rédigée à l'attention des professionnels de santé ([voir pièce jointe](#)).

Actualités internationales

Chikungunya

- La Nouvelle-Calédonie recense au 18 mai un nombre total de 28 cas (27 cas confirmés et 1 probable), localisés dans plusieurs quartiers à Nouméa et à Dumbéa . Détails sur : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya
- L'alerte épidémique n'est pas encore déclenchée en NC. La situation est donc suivie avec la plus grande attention.

Rougeole

- La France est actuellement confrontée à une épidémie de rougeole : 5 000 cas en 2010, plus de 3 400 cas en janvier /février 2011.

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées
Centre Hospitalier de Polynésie française ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ;
Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacies d'officine


Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Agnès Rodrigues-Da-Costa, Secrétaire : Thilda Tehaamoana


Tél: 48 82 01 - fax: 48 82 12 - mail : veille@sante.gov.pf

Grippe


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes grippaux vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle



Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome grippal




Nombre et types de virus isolés pour des syndromes grippaux, par semaine (données ILM)




Dengue


Nombre hebdomadaire moyen de syndromes dengue-like vus en consultation, par médecin participant au réseau sentinelle





Nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour syndrome dengue-like





Evolution hebdomadaire des demandes de diagnostic de dengue et du taux de positivité (données ILM)





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11

Suspicion de dengue: A90 - A91

Diarrhée: A02 à A09

Fièvre isolée: R509

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM