

Données de surveillance du réseau de médecins sentinelles






Point épidémiologique hebdomadaire - Semaine 38 - 2010

La tendance à l'augmentation des consultations pour syndromes grippaux se confirme, toujours très marquée à Uturoa, et constatée aussi, dans une moindre mesure, en zone urbaine de Tahiti.

Par ailleurs une augmentation des syndromes grippaux est également rapportée dans de nouvelles îles du Pacifique (Samoa américaines, Fiji, ...)

Aucun prélèvement n'ayant été réalisé par le réseau depuis 2 semaines, **nous vous demandons de réaliser ces prélèvements pour recherche de virus grippal dès que possible** (kit de prélèvement à demander à l'ILM, fiches en PJ).

Merci de maintenir votre niveau de vigilance et de nous renvoyer votre fiche chaque semaine, même si aucun syndrome n'est rapporté



Les graphiques 1,2, 3 et 4 représentent la répartition hebdomadaire des consultations depuis 2008 (depuis 2010 seulement pour le syndrome fièvre). Ces données sont exprimées en nombre moyen de cas vus en consultation, par médecin et par semaine.

Définition des syndromes surveillés :

Syndrôme grippal :
 Fièvre élevée (≥ 38.5)
 d'apparition brutale
 ET accompagnée de myalgies ou fatigue
 ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
 Fièvre élevée (≥ 38.5)
 d'apparition brutale datant de moins de 8 jours
 ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies
 ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhée :
 Au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre prolongée (autre que dengue et grippe) :
 Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente