





Données de surveillance du réseau de médecins sentinelles Pf

Point épidémiologique de la semaine 41 - 2010

21 octobre 2010

- Persistance du nombre élevé de syndromes grippaux rapportés, en particulier aux Iles sous le Vent et également aux Marquises. toujours pas de virus identifié => intérêt de **prélèvement devant tout syndrome grippal**
 - L' épidémie de conjonctivite s'intensifie (13 cas /semaine/médecin sentinelle) et s'est étendue à l'ensemble de la Polynésie
 - Le nombre de diarrhées rapporté chez les enfants est également en forte augmentation (4,7 cas/semaine/médecin sentinelle), principalement à Tahiti ; le germe le plus fréquemment retrouvé est un rotavirus. Par ailleurs, une épidémie est signalée à Ua Pou, dans le contexte d'une sécheresse persistante.

Au niveau régional, les épidémies de grippe se terminent en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Nouvelle-Calédonie. Par contre, une augmentation du nombre de syndromes grippaux est rapportée à Guam, Fiji, Marshall Islands et Samoa.



Les graphiques 1,2,3 et 4 représentent la **fréquence hebdomadaire des consultations** pour chacun des syndromes surveillés.
 Les données sont exprimées en **nombre moyen** de consultations, par médecin du réseau et par semaine.

Définition de cas des syndromes surveillés :

Syndrôme grippal :
 Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale
 ET accompagnée de myalgies ou fatigue
 ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :
 Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours
 ET syndrome algique : céphalées, arthralgies ou myalgies
 ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhée :
 Au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) :
 Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente