

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 19 août 2011 - Semaine 32-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 32 (08 au 14/08/2011)

Grippe

- Activité faible. Pas de grippe confirmée en laboratoire.

Denque

- Activité faible. Aucune dengue confirmée sur 9 prélèvements analysés.

Diarrhées

- Activité faible.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Urétrite masculine

- Une surveillance des infections sexuellement transmissibles a été mise en place via l'indicateur de l'urétrite masculine. Merci à l'ensemble des médecins sentinelles de bien vouloir nous les notifier.

Chikungunya

- Aucun cas confirmé en Pf. Toute demande de confirmation biologique de cas suspect doit être adressée au Bureau de veille sanitaire, via la fiche de surveillance.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Epidémie de grippe en Australie:

- Au 5 août, 13 521 cas confirmés de grippe ont été enregistrés. Le nombre hebdomadaire déclaré est supérieur aux nombres enregistrés à la même période les années précédentes. Le Queensland est particulièrement touché, suivi par la Nouvelle-Galles du Sud. Il s'agit en majorité du virus pandémique A(H1N1) 2009, avec une co-circulation de l'influenza B. Pour plus de détails,

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm

Fièvre typhoïde à Fidji :

- Huit cas de fièvre typhoïde ont été confirmés à l'hôpital de Lautoka au mois de juillet. 4 cas avaient été confirmés au cours des deux mois précédents. Pour plus de détails :

www.fijitimes.com/story.aspx?id=178078

Epidémie de rougeole en Nouvelle-Zélande

- Au 18 août, 109 cas de rougeole ont été confirmés à Auckland et 19 cas confirmés et un cas suspect dans la région de Waikato. Sur les 20 cas enregistrés dans la région de Waitako, 19 n'avaient pas été vaccinés et 1 avait reçu une seule des deux doses de vaccin ROR recommandé. Pour plus de détails:

www.nzherald.co.nz/health/news/article.cfm?c_id=204&objectid=10745485

Syndromes grippaux à Tokelau et aux Samoa

- Le nombre de cas de syndromes grippaux dans les deux pays est en baisse. Les résultats des prélèvements nasopharyngés sont toujours en attente.

Chikungunya en NC

- La NC recense 33 cas confirmés (3 cas à Dumbéa, 29 cas à Nouméa et 1 cas à Sarramea). Pas de nouveau cas déclaré depuis 9 semaines. Détails sur :

http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/sante/themes_sante/Chikungunya

A noter que la rubéole et la rougeole circulent actuellement dans le Pacifique. Les cas suspects doivent être testés.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française:

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Auguste Buluc, Jean-Paul Pescheux, Eddy Frogier, Secrétaire : Thilda Tehaamoana
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM