

SURVEILLANCE DE LA DENGUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Point épidémiologique mensuel - Situation en semaine 2 (du 7 au 13 janvier 2008)

Données recueillies par la Direction de la Santé avec la collaboration de l'Institut Louis Malardé et du Centre Hospitalier de Polynésie française

L'année 2008 commence doucement; 13 cas positifs recensés par les laboratoires depuis le début de l'année. Aucun cas hospitalisé depuis le début de l'année. Seul le sérotype 1 continue à être isolé. En 2007, un total de 1894 cas positifs avaient été recensés dont 138 avaient nécessité une hospitalisation, principalement dans la classe d'âge 10-19 ans, et 28 cas avaient été classés comme formes sévères.

Merci de rester vigilants et de demander un examen biologique de confirmation (si possible avant J6 de la maladie) pour toute personne suspecte de dengue qui a voyagé hors Polynésie française dans les 15 jours qui ont précédé le début des symptômes. Pour rappel c'était juste après les vacances de Noël que, l'an passé, nous avions détecté le cas de sérotype 2, qui était resté isolé fort heureusement.


Merci pour votre collaboration et très bonne et heureuse année 2008!

Répartition des cas de dengue par île				
Archipel	Iles	Nombre de cas positifs	Taux pour 100 000 habitants*	Nombre de nouveaux cas en S2
Iles du Vent	Tahiti	11	6	7
	Moorea	1	6	0
Iles sous le vent	Bora Bora	0	0	0
	Huahine	0	0	0
	Maupiti	0	0	0
	Raiatea	1	8	1
	Tahaa	0	0	0
Marquises	Nuku Hiva	0	0	0
	Ua Pou	0	0	0
	Hiva Oa	0	0	0
	Fatu Hiva	0	0	0
	Tahuata	0	0	0
Australes	Raivavae	0	0	0
	Rurutu	0	0	0
	Tubuai	0	0	0
TG	Fakarava	0	0	0
	Rangiroa	0	0	0
	Manihi	0	0	0
	Hao	0	0	0
Indéterminé touriste		0	-	0
		0	-	0
Total		13	5	8

*ISPF - Recensement général de la population de la Pf- 2007

Répartition des cas de dengue par tranche d'âge			
Classe d'âge	Nombre de cas positifs	Taux pour 100 000 habitants*	N nouveaux cas en S2
< 5 ans	1	4	0
5-9 ans	4	17	2
10-19 ans	4	8	4
20-29 ans	1	2	1
30-39 ans	2	5	1
40-59 ans	1	2	0
60 ans et +	0	0	0
Total	13	5	8

Graphique 1: Evolution des cas de dengue par semaine



Lutte contre les gîtes larvaires

Un gîte larvaire est constitué de tout récipient contenant de l'eau stagnante (même sur 1 cm de profondeur) où les moustiques vont pondre des oeufs.

Les gîtes plus fréquents sont les suivants :

- vieux pneus (très productifs en moustiques)
- objets abandonnés : carcasses de frigo, boîtes vides...

- gouttières bouchées par des feuilles
- puisards, boîtes à graisse non étanches (à colmater)

- vases et soucoupes de pots de fleurs
- bâches, bidons...


La lutte contre ces gîtes par la population doit être p (un fois par semaine).



Partenaires du réseau de surveillance de la dengue en Polynésie française:

- Médecins libéraux: Barraille D, Cousin E, Debruyne JM, Debruyne V, Galichet MP, Penanhoat P, Pigot S, Reynaud P, Rougier P, Turgeon V, Valence V, Vanduille O.
- Centre Hospitalier de Polynésie française: Laboratoire d'analyses médicales, Service des Urgences, Services d'Hospitalisation, Service d'information médicale
- Hôpitaux publics: Moorea, Taravao
- Dispensaires et Centres médicaux : Arue, Bora Bora, Faa'a (1), Mahina, Papeete, Papara, Papeete, Uturoa
- Centre de la Mère et de l'Enfant: Centre de Consultation Spécialisé en Hygiène Scolaire, Centre de Protection Infantile
- Institut Louis Malardé
- Services de Santé des Armées: CCIA, Base Navale, Base Aérienne
- Cliniques privées: Cardella et Paofaï

Graphique 2: Répartition des cas hospitalisés par sévérité



Conseils aux parents

NE PAS DONNER D'ASPIRINE NI DES AINS

Chez un enfant atteint de dengue, il est nécessaire de surveiller très attentivement, entre le 4ème et le 7ème jour de la maladie, la survenue des signes suivants :

- douleurs abdominales intenses, vomissements persistants
- saignements du nez ou des gencives
- tâches rouges s'étendant sur la peau (purpura)
- fatigue importante, pâleur du visage, lèvres bleutées, extrémités froides

Ces signes doivent conduire à **consulter rapidement un médecin**.

La protection individuelle (moustiquaires, répellents corporels) est à privilégier.

Pour tous renseignements ou si vous souhaitez rejoindre le réseau de surveillance de la dengue:

Direction de la Santé - Bureau des Pathologies Infectieuses

axel.wiegandt@sante.gov.pf

Tel: 48 82 01 - Fax: 48 82 24