



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

13 mars 2015

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 23 février au 8 mars 2015  
(Semaines 09 et 10)

### A RETENIR

- CHIKUNGUNYA :** Circulation en très forte baisse sur tout le territoire, en particulier à la Société.
- GRIPPE :** Epidémie saisonnière persistante.  
Pensez aux prélèvements ainsi qu'à la vaccination des personnes à risques.
- LEPTOSPIROSE:** 7 nouveaux cas déclarés en S09 et S10 : Situation épidémique, **RESTEZ VIGILANT**
- DENGUE :** Circulation de plus en plus faible sur le territoire.  
Restez vigilant, risque d'introduction des sérotypes 3 et 2 circulant actuellement dans le pacifique.

### ACTUALITES LOCALES




#### Syndromes grippaux

- Poursuite de l'épidémie de grippe

- Deux cas de grippe A confirmés en S10 (en cours de sous-typage)

Merci de réaliser des prélèvements nazo-pharyngés afin de déterminer la souche circulante (Kits à demander à l'ILM).

\*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL







## Syndromes "dengue-like" et cas confirmés de dengue

- Toujours peu de syndromes "dengue-like" rapportés, mais légère augmentation en S10 des cas suspects ainsi que des cas confirmés (15 cas confirmés par AgnS1 et/ou PCR)
- Le sérotype 1 est le seul détecté actuellement parmi les prélèvements traités par PCR

\*Rappels :

**Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^\circ\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



**Leptospirose : Situation épidémique persistante**

Depuis le début 2015, c'est 35 cas de leptospirose au total qui ont été identifiés, jusqu'à la fin de la semaine 10.

Durant les deux dernières semaines, 7 nouveaux cas ont été rapportés.

Les cas sont survenus à Tahiti (19), Moorea (5), Huahine (4), Raiatea (4), Tahaa (2) et Atuona (1).

**Formes persistantes du Chikungunya :**

Nous rappelons que près de 50% des personnes atteintes initialement par le virus du Chikungunya sont susceptibles de voir leurs **signes cliniques (douleurs articulaires notamment) persister ou réapparaître**. Il s'agit de la **continuité de l'infection initiale** (et non d'une réinfection).

En effet, une fois infectées par ce virus les personnes sont **immunisées (protégées du virus)** et donc **ne peuvent plus être infectées** et ne sont plus non plus contagieuses pour les autres. Ces formes persistantes peuvent être traitées par antalgiques voire par des anti-inflammatoires si nécessaire.

**Chikungunya aigu**

Plus de 69 000 cas cliniquement évocateurs consultants estimés au total\*

Soit plus de **25%** de la population polynésienne

Le nombre de cas est en baisse sur tout le territoire et les taux d'incidence sont devenus très faibles :

- Incidence quasi-nulle aux IDV et aux TG
- Incidence très faible à Raiatea
- Incidence en baisse aux Marquises (Nuku Hiva, Hiva Oa, Fatu Hiva) et aux Australes (Tubuai)

\*Estimation réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi - données non consolidées

**Estimation du nombre de cas de Chikungunya ayant consulté, par semaine et par île/archipel, 2014**

